

# Нуклекс

рибонуклеиновая кислота

## для лечения и профилактики ГРИППА и ОРВИ

### СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

разрушает вирусные РНК путем фрагментации, ингибирует нейраминидазу вируса гриппа<sup>1,2</sup>, блокирует репликацию вируса и препятствует проникновению его в клетки

### НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

повышает синтез интерферона

### ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

## Как применять?

- **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:**  
2 капсулы 3 раза в день
- **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ:**  
1 капсула 1 раз в день



# Нуклекс

рибонуклеиновая кислота

**на 30%**

повышает общую эффективность лечения пациентов с ГРИППОМ и ОРВИ<sup>1</sup>

**на 70%**

снижает частоту осложнений ГРИППА и ОРВИ (бронхита, пневмонии, синусита, среднего отита<sup>3</sup>)

**на 1-3 дня**

уменьшает длительность клинических проявлений ГРИППА и ОРВИ<sup>1</sup>

## Краткая информация по медицинскому применению препарата

### Состав лекарственного средства:

*действующее вещество:* кислота рибонуклеиновая; 1 капсула содержит кислоты рибонуклеиновой в пересчете на 100 % вещество 250 мг; *вспомогательное вещество:* маннит.

**Лекарственная форма.** Капсулы №40.

**Фармакотерапевтическая группа.** Противовирусные средства. Код АТС J05.

### Показания к применению.

Как противовирусный препарат для профилактики и терапии ОРВИ и гриппа. В комплексной терапии хронических вирусных гепатитов, урогенитального герпеса.

### Противопоказания.

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, гемобластозы (лейкозы, злокачественные лимфомы). Подагра.

### Способ применения и дозы.

Как противовирусный препарат назначают перорально взрослым по 500 мг 2-3 раза в сутки, до или после еды в течение 5-7 дней, а затем – по 250 мг 2 раза в сутки в течение 7-14 дней. Профилактически перорально – 250 мг до или после еды на время эпидемии ОРВИ и гриппа.

### Побочные эффекты.

*Со стороны пищеварительного тракта:* при пероральном применении натошак возможна боль в эпигастрии. *Со стороны обмена веществ:* повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови.

Возможны проявления гиперчувствительности.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При лечении антибиотиками и витаминами применение препарата в комплексной терапии значительно усиливает терапевтическую эффективность лечения.

### Название и местонахождение производителя.

ООО «Фарма Старт», Украина, 03124, г. Киев, б-р И. Лепсе, 8.

### Отпускается без рецепта врача

Информация приведена сокращенно, полный текст см. в инструкции по медицинскому применению препарата. Информация о лекарственном средстве не является рекламой для потребителей. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «Валартин Фарма», г.Киев, ул. М. Котельникова, 1 оф.96

Р.с. № UA/5066/01/02 от 15.07.15

Информация предназначена для профессиональной деятельности фармацевтических и медицинских работников; для медицинских учреждений и врачей, а также для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике.

1. Инструкция для медицинского применения препарата Нуклекс.

2. Ткачук З.Ю., Зарубаз В.В., Семерникова Л.И. Противовирусна дія препарату Нуклекс на віруси грипу, парагрипу та пташиного грипу //Український медичний альманах, 2011, том 14, №6, с.209-2012.

3. Відкрите дослідження по вивченню ефективності та безпечності препарату Нуклекс, капсули у лікуванні ГРВІ або грипу у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями//Тернопіль, 2009, с.1-38.

**Valartin**  
pharma